BAUD
PARCOURS ORNITHOLOGIQUE

Les oiseaux sont les seuls descendants actuels des dinosaures théropodes et pourtant ils n'ont plus rien en commun avec le terrifiant tyrannosaure. Comme les insectes, les oiseaux ont largement précédé l'Homme dans l'échelle de l'évolution. Ils ont eu le temps de développer toutes les astuces qui leur permettent de voler aujourd'hui.

La diversité des couleurs et des chants des oiseaux est stupéfiante.

En nous baladant, accordons quelques minutes aux oiseaux qui nous entourent. Observons-les, essayons de les reconnaitre, écoutons leur chant…

Soyons curieux et découvrons au cœur de nos jardins ou dans la nature ces trésors de la biodiversité. Prendre soin de la nature ne commence t-il par sa connaissance ?

Après l'album sur la botanique, j'espère attiser votre curiosité avec une approche simple des oiseaux que l'on peut rencontrer en se promenant à Baud.

Pascale Gillet-Guyader
1ère adjointe
Culture et Communication

Installez un nichoir dans votre jardin ? Oui, plusieurs espèces ont besoin de sites de nidification artificiels car leurs habitats naturels s'appauvrissent. Alors oui, aidons les oiseaux ! N'oubliez pas de le nettoyer une fois par an.

Installez une mangeoire ? Oui, mais seulement pendant la période de froid et à condition de la nettoyer tous les 15 jours. Trop d'oiseaux meurent à cause de nos mangeoires infestées de parasites, de bactéries ou de virus. Installez-les à 1.5m du sol minimum sinon les chats vont festoyer ! Et n'oubliez pas une coupelle d'eau…

Régalez-vous du spectacle qu'il vont vous offrir !

Le **Rougegorge familier** ou ***Erithacus rubecula*** est l'hôte classique de nos jardins. C'est une espèce de passereau. Le mâle et la femelle sont quasi identiques. Seuls les petits sont difficiles à identifier car ils n'ont pas encore leur tâche rouge. Son âge maximum est de 18 ans. Son chant mélodieux et allongé lui sert à défendre son territoire. Il chante toute l'année sauf en été.

Il recherche essentiellement sa nourriture au sol. Il ne supporte aucune intrusion sur son territoire. Il bombe sa poitrine et lève la tête pour intimider l'intrus. Il se nourrit d'insectes rampants, de fruits et de baies.

La **Mésange charbonnière** ou ***Parus major*** se reconnait facilement à sa tête noire, ses joues blanches et son ventre jaune. C'est une espèce de passereau de la famille des Paridés. Elle se nourrit de petits invertébrés (mouches, araignées, papillons, vers de terre) de fruits et de graines. Elle vit en groupe et vient visiter volontiers vos mangeoires. Elle zinzinule ! Son chant est basé sur 2, 3 à 4 notes aigues, au rythme marqué qu'elle répète plusieurs fois. Elle peut atteindre les 15 ans mais en milieu naturel son espérance de vie n'excède pas 2 ou 3 ans.
Jardiniers : utilisez la mésange comme moyen de lutte biologique et supprimez les pesticides !
C'est une espèce protégée.

Le **Chardonneret élégant** ou ***Carduélis carduélis*** se remarque par ses couleurs éclatantes, avec sa face rouge et son masque de couleur noire. C'est un passereau de la famille des Fringillidés. Son chant est un gazouillis fluide et répété. Lorsqu'il est anxieux, il chante des « éh-i », quand il est agressif , il sort un son guttural « crrrr ». Son répertoire est riche et mélodieux. Assez farouche, il se perche à la cime des arbres. Lors de la parade nuptiale, il est élégant mais aussi agressif. Il n'est pas rare d'entendre les disputes entre mâles. Il est exclusivement granivore. Il vit une douzaine d'années maxi 15 ans. Il est en danger pour 2 raisons : les pesticides et sa capture pour en faire un oiseau d'ornement.

Le **Verdier d'Europe** ou ***Chloris chloris*** est un oiseau au bec fort et trapu et comme son nom l'indique de couleur verdâtre. C'est un passereau partiellement migrateur de la famille des Fringillidés. La femelle est plus sombre et moins verte que le mâle. Il chante souvent perché mais aussi en vol. Sa voix sonore et rapide est un gugugu léger. À la saison des nids, il lance un « tsouii » nasal. Il ne craint pas la présence de l'homme. Sa durée de vie est d'environ 13 ans. Le verdier s'est habitué aux mangeoires et son taux de mortalité est particulièrement élevé à cause de leurs mauvais entretiens.

VIDEZ ET NETTOYEZ VOS MANGEOIRES régulièrement !

Le **Pinson des arbres** ou **Fringilla coelebs** est un passereau partiellement migrateur de la famille des Fringillidés, espèce protégée en France. Le mâle adulte a le dos brun-noisette, le ventre et la gorge rosâtres, les côtés de la tête rougeâtres et la nuque bleu-gris ce qui le différencie de la femelle, plus terne. Il se nourrit de graines et d'invertébrés. Son chant est une série brève de notes descendantes « tchip-tchip-tchip-tchip-chett-chett-chett -chett-diddip-diddiooo ». Son cri à l'arrêt est un typique « pink-pink » bien audible, et au vol, c'est un « yup-yup ». Le mâle est le seul à chanter. Il vit entre 5 et 10 ans.

La **Pie bavarde** ou ***Pica pica*** a une taille assez importante. C'est une espèce de Corvidés. De couleur noire et blanche, c'est un oiseau amusant qui n'hésite pas à venir vous rendre visite et vide vos mangeoires en très peu de temps ! Elle régresse dans nos campagnes pour devenir urbaine. Sa durée de vie est de 15 ans mais certaines vivent plus de 20 ans. La pie est omnivore. Elle jacasse. Ses vocalisations sont variées mais toujours un peu nasales et rauques. Son cri de conversation est un « tcha-ka » ou « tchia tcha » claquant. Cet oiseau mémorise bien son environnement, c'est l'un des plus intelligents. Il est capable de stratégies de groupe. Il a conscience de se voir dans un miroir. Il a donc une conscience de soi comme l'homme, le chimpanzé, le dauphin, l'éléphant,...Contrairement aux idées reçues, la pie ne serait pas cleptomane.



Le **Merle noir** ou ***Turdus mérula*** se reconnait à son plumage entièrement noir constant avec l'entourage de l'œil et son bec orangé. C'est un passereau de la famille des Turdidés. La femelle a un plumage brun roussâtre et son bec est marron. Il est omnivore. Chaque individu délimite son territoire. On dit que le merle siffle, flûte, appelle ou babille. Cette espèce est monogame, la fidélité étant généralement la règle jusqu'au décès d'un des partenaires. Mais des études ont montré que le taux de paternité adultérine peut atteindre 17 % chez cette espèce ! Sa durée de vie est de 5 ans en moyenne. Pour les Grecs anciens, le merle noir était sacré.

Le **Moineau domestique** ou ***Passer domestica*** est le plus connu bien que sa population semble en déclin depuis plusieurs années. C'est un passereau de la famille des Passeridae. Les mâles, gris-brun, sont très différents des femelles, beige-chamois. Le bec des femelles est brun clair. Le moineau est très sociable. Il vit souvent en bande. Il perche en groupe. Il pépie, ses vocalisations s'apparentent à un « tchip tchip » court et répété. Il se nourrit principalement de graines de céréales mais mange aussi des petits animaux : chenilles, lézards, sauterelles, grillons,...

La **Fauvette à tête noire** ou ***Sylvia atricapilla*** est un oiseau de couleur grisâtre, avec le dessus de la tête noir pour le mâle et brun-roux pour la femelle. C'est un passereau de la famille des Sylviidae. C'est une migratrice partielle. C'est un oiseau discret que l'on repère surtout par son chant. Elle se nourrit principalement d'insectes et de fruits. Elle se fait souvent capturer par les éperviers et les faucons pendant la migration.

La **Fauvette des bois** ou **des jardins** a un plumage « neutre ». Son chant est beau, montant ou descendant sans mélodie définie, et ressemble à celui de la fauvette à tête noire.

La **Mésange bleue** ou ***Cyaniste caeruléus*** est un passereau de la famille des paridés. Elle se distingue des autres mésanges par le dessus de sa tête de couleur bleutée. Elle est fascinante à observer. Si vous lui créez un nichoir, elle n'hésite pas s'installer et vous pouvez alors admirer les ballets d'allers-retours des parents qui nourrissent leurs petits. En période de reproduction, son régime alimentaire est insectivore et en dehors, il est granivore. La mésange bleue zinzinule ou zinzibule. Elle niche principalement dans les trous d'arbre de vieux feuillus. Elle vit en moyenne 10 ans. Elle adore les vers de pommes et les pucerons. Alors installez-lui un nichoir pour protéger vos fruitiers !

La **Mésange à longue queue** est une espèce de passereau de la famille des Aegithalidés et non des paridés comme les autres mésanges. Son nom usuel est le « **tupinet** ». Elle est sédentaire et occupe presque tous les habitats : bois, parcs, jardins,...C'est un minuscule oiseau avec une très longue queue et des petites ailes rondes, au ventre blanc légèrement rosé, à la tête blanche et grise avec, chez la grande majorité des individus une bande noire du front à la nuque passant au-dessus de l'œil. En dehors de la période de nidification, la mésange à longue queue vit en bandes familiales ou petits groupes d'une dizaine à une trentaine d'oiseaux, volant d'un arbre à l'autre. Elle se nourrit essentiellement d'insectes et de quelques graines . Elle ne dédaigne pas vos mangeoires en hiver.

La **Mésange à tête noire** est une espèce de passereau de la famille des Paridés. Cet oiseau se caractérise par sa calotte noire, ses joues blanches, le dos gris, le ventre blanc et les flancs chamois, parfois elle peut avoir des parties bleutées près des ailes. C'est une visiteuse habituelle des mangeoires en hiver. Elle est très curieuse. Elle n'hésite pas à venir manger dans vos mains si on lui tend des graines de tournesol. Elle se nourrit l'été surtout d'insectes mais aussi de baies, de jeunes bourgeons, de tous petits escargots et de graines. Les mésanges adoptent des postures acrobatiques, le plus souvent suspendues la tête en bas pour dénicher leur nourriture dans les endroits les plus inaccessibles.

Le **Geai** « cajole ». Quand il pousse un cri, il cajacte, cacarde, frigulote ou jase. Le nom de genre du **Geai des chênes** est ***Garrulus***, ce qui signifie « bavard ».

Cet oiseau est à l'origine d'un dicton printanier :
« **En mai, fleurit le hêtre et chante le geai** ».

L'**Accenteur mouchet** ou ***Prunella modularis*** est une espèce protégée de la famille des Prunelladae. Il se nourrit d'insectes qu'il cherche dans l'humus près du sol. Pendant l'hiver, il mange des

baies et de graines qu'il ramollit grâce à son jabot.

Le **Choucas** est aussi appelé corbeau choucas ou corneille des clochers. Il appartient à la famille des Corvidés. Ses yeux ont la particularité d'avoir des iris blanc. Il est omnivore. Le soir, les choucas peuvent se rassembler par centaines pour passer la nuit dans des arbres-dortoirs.

Le **Pic vert** ou **Pivert** ou ***Picus viridis*** est une espèce appartenant à la famille des Picidae. Qu'il soit mâle ou femelle, le pic vert a la face supérieure verte, le croupion jaune, la face inférieure gris-vert et le dessus de la tête rouge. La femelle se distingue par sa moustache noire, tandis que celle du mâle est rouge. Cet oiseau se nourrit principalement d'insectes et de larves, capturés sur le sol. Il recherche particulièrement les fourmilières dans les prés. Leur cri d'appel est très sonore, il est semblable à un rire. Ce pic creuse son nid dans le tronc d'un arbre feuillu.

Le **Pic épeiche** se caractérise par un plumage rayé de blanc et de noir et une tache rouge écarlate sur le bas-ventre près de la queue. Il vit solitairement ou en couple dans un territoire dont il ne s'éloigne guère. Oiseau grimpeur montant ou descendant à reculons, il utilise ses pattes pour se maintenir à la verticale des branches qu'il parcourt.

Le **Lanius** est un passereau de la famille des Laniidae appelé **Pie-grièche.** Son plumage est essentiellement gris et/ou brun, avec des parties plus ou moins variées de blanc et de noir, quelquefois des taches roses ou roux vif.

Le **Martin-pêcheur** est une espèce d'oiseau de la famille des *Alcedinidae*. Cet oiseau est un bon indicateur naturel de la qualité d'un milieu aquatique. Le sexe des Martins-pêcheurs se différencie à la couleur du bec : presque tout noir chez le mâle ; chez la femelle, la mandibule est du même orange que ses pattes. Il se nourrit de petits poissons et de petits animaux aquatiques. C'est pourquoi il vit à proximité des étendues d'eau où il peut se nourrir en abondance. Sa proie repérée, généralement depuis un perchoir, il plonge en percutant violemment la surface de l'eau, l'attrape, puis l'avale tête la première dans le sens des écailles. Il est menacé par la destruction des zones humides et la pollution des eaux de surface.

La **Sittelle torchepot** ou ***Sitta europaea*** est une espèce de la famille des Sittidae. C'est un oiseau trapu à la queue courte et au long bec. Les parties supérieures sont bleu-gris, les parties inférieures peuvent être blanc pur ou roux jaunâtre, avec ou sans zone pâle sur la joue. L'oiseau a également un trait oculaire noir. Il se nourrit principalement d'insectes, notamment de chenilles et de coléoptères.

Le **Troglodyte mignon** est une espèce de passereau de la famille des Troglodytidae. Il est de très petite taille et d'une grande vivacité. Son corps rond est revêtu d'un plumage brunâtre et légèrement barré.

Le **Corbeau** est un oiseau réputé pour sa grande longévité (qui pourrait dépasser trente ans), son intelligence et son organisation sociale semblent très supérieures à la moyenne des oiseaux. Du fait de son comportement charognard, le corbeau a aujourd'hui une mauvaise réputation.

La **Corneille noire** ou ***Corvus corone*** est une espèce de passereau de la famille des Corvidae. Elle pond des œufs vert-bleu turquoise. À la campagne, elle craint le voisinage de l'homme qui souvent cherche à la détruire ignorant les services qu'elle lui rend et ne lui reprochant que les dégâts qu'elle peut occasionner aux cultures, mais en ville elle a su parfaitement s'adapter, s'approchant de très près de ceux qui la nourrissent.

Le **Pouillot véloce** ou ***Phylloscopus collybita*** est une espèce de la famille des Phylloscopidae. Brun verdâtre dessus et blanc cassé dessous, il possède un chant caractéristique à deux tons. Ce petit oiseau est insectivore.

L'**Engoulevent d'Europe** est une espèce d'oiseaux de la famille des Caprimulgidae. C'est un oiseau crépusculaire et nocturne. Il possède un plumage très complexe, mêlant le gris, le beige et le brun, qui lui confère un camouflage efficace le jour, lorsqu'il reste posé au sol ou perché, immobile, le long d'une branche. Le cou est court, portant une grosse tête munie d'un petit bec.

Le **Serin cini** appartient à la famille des Fringilladae. C'est une espèce proche des serins des canaris. À l'automne, ils se regroupent pour rejoindre la région méditerranéenne. Leur retour a lieu à la mi mars. Il se nourrit le plus souvent à terre, picorant de menues graines d'herbes sauvages telles que plantain, séneçon, mouron et diverses graminées.



L'**Etourneau sansonnet** ou ***Sturnus vulgaris*** est un passereau de la famille des Sturnidae. Il est connu pour ses capacités vocales qui lui permettent d'imiter avec une grande précision les vocalisations d'autres individus, de la même espèce ou non, ainsi que des bruits non biologiques issus de son environnement. Il est omnivore. Cette espèce donne un spectacle impressionnant à voir et à entendre, en particulier lorsqu'elle forme des nuées d'individus à l'occasion de certains de ses déplacements.



Le **Bouvreuil pivoine** ou ***Pyrrhula pyrrhula*** est une espèce de passereau appartenant à la famille des Fringillidae. Il vit et se nourrit en couple. Il disparaît rapidement si on l'approche. Le plumage de son dos est gris-bleu, les ailes et la queue sont noires ainsi que le dessus de la tête. Le croupion est blanc. Le mâle se distingue par ses joues, sa poitrine et son ventre rouge rosé. La femelle arbore une poitrine plus terne, gris-orangé ou beige. Il est presque exclusivement granivore. Cet oiseau décroit, à cause de la perte de son habitat, aux pesticides et au réchauffement climatique. Comme on le voit peu, il est plus facilement repérable par son chant très dépouillé, un bref sifflement, doux et mélancolique, sur une seule note.

L'**hirondelle de cheminée ou Hirondelle rustique** est une espèce migratrice de passereaux. Ce sont des oiseaux appartenant à la famille des Hirundinidae. Elle se distingue par sa longue queue fourchue et sa gorge couleur rouge brique. Le nid est bâti avec des morceaux de boue qu'elle malaxe pour former de petites boules et consolidé avec des herbes, de la paille ou d'autres matériaux.

L'**Hirondelle de fenêtre** fait souvent son nid, comme son nom l'indique, au-dessus d'une fenêtre, dans les gîtages d'une charpente ou sur d'autres structures artificielles. Son plumage est noir, avec des reflets bleutés luisants au-dessus et le croupion bien blanc, très visible, même de loin.



L'**Hirondelle de rivage** est la seule hirondelle à dos brun. Contrairement à ses cousines et aux martinets, cette hirondelle vole près du sol et souvent au ras de l'eau, très rarement en altitude. On peut l'observer vers Coët Er Houarn à Baud.

Les hirondelles sont des espèces protégées mais leur population est en régression de 30% en France en partie à cause du réchauffement climatique mais surtout à cause de l'empoisonnement de leur nourriture par les insecticides, de l'altération de leurs lieux de nidification et de la pollution urbaine. Le voyage de retour représente une distance qui peut dépasser les 10 000 km, avec pour seul carburant quelques grammes de graisse. Elles retrouvent le lieu où elles nichaient l'année précédente, lorsqu'elles reviennent d'Afrique.

C'est un oiseau porte-bonheur, messager du printemps.

Le **Martinet** est le nom donné à plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs de la famille des Apodidae. Ils est souvent confondu avec l'hirondelle et la chauve souris. Ses ailes sont arquées et effilées vers l'arrière. Il ne se pose presque jamais.

Le Martinet est capable de rester en vol pendant une très longue durée, 10 mois entiers sans se poser une seule fois ! Il peut atteindre les 200km/h, sur de courtes distances. Ce qui fait de lui, l'un des oiseaux les plus rapides. Il peut aussi dormir ou s'accoupler en volant. Comme tous les insectivores, le martinet subit l'impact de l'usage croissant des insecticides qui déciment une partie de ses proies. Il se nourrit aussi du plancton aérien dans les couches inférieures de la troposphère.

Le **Tarin des aulnes** ou ***Spinus spinus,*** est une espèce de passereau, partiellement migrateur, de la famille des Fringillidés. Le mâle a la calotte et le menton noirs, l'arrière-sourcil jaune et les joues verdâtres. La femelle ne possède pas la calotte noire et est moins bariolée. Elle est beaucoup plus rayée à la poitrine et au flanc. Son chant, assez aigu et perçant, est un gazouillis musical incessant. Lorsqu'il se nourrit, son comportement se rapproche de celui des mésanges, car il se perche facilement la tête en bas pour atteindre sa nourriture. Il vit en moyenne 10 ans. Il aime les conifères, les aulnes et les bouleaux et il n'hésite pas à se rapprocher des habitations, où il fréquente volontiers vos mangeoires.

Le **Coucou gris** ou ***Cuculus canorus*** est une espèce d'oiseau de la famille des Cuculidés. Il est insectivore et se nourrit généralement des chenilles ; il est le seul oiseau à pouvoir digérer les plus velues. C'est un migrateur qui signe son retour au printemps. Le coucou pratique le parasitisme de couvée, qui consiste pour la femelle à pondre dans le nid d'une autre espèce afin que celle-ci assure la couvaison de l'œuf puis l'alimentation du jeune individu. Elle gobe un œuf dans le nid parasité, avant d'y pondre le sien. Il est capital que le petit coucou éclose en premier. Ainsi, il se débarrasse des autres œufs du nid pour profiter seul de la nourriture. Le folklore raconte que si un promeneur a de l'argent en poche lorsqu'il entend le premier coucou de l'année, il sera riche l'année entière !

La **Bergeronnette grise** ou ***Motacilla alba***, aussi appelée hochequeue gris, est une espèce de petit passereau. Elle est considérée comme un emblème national en Lettonie. Elle niche dans les interstices des murs de pierre, sous les toits, dans les ponts ou dans des trous d'arbres. Son nid est fait de paille, de feuilles et de racines. C'est un insectivore se nourrissant essentiellement de mouches, de moustiques et de fourmis.

L'**Alouette des champs** ou ***Alauda arvensis*** appartient à la famille des Alaudidae. Le plumage de l'alouette des champs est peu voyant, brun strié de brun-noirâtre dans la partie supérieure avec une calotte un peu plus foncée et une gorge jaune, finement striée de brun foncé. La crête sur le sommet de la calotte se hérisse à certains moments. L'alouette court à ras le sol et s'y aplatit en cas de danger. Elle chante. On dit qu'elle grisolle, tirelire ou turlutte de façon très mélodieuse, parfois pendant plus d'une heure, et comme celui du rossignol, ce chant fascine les humains. Elle se nourrit d'insectes et de larves, de vers de terre, graines et semences diverses.

La **Bergeronnette printanière** bénéficie d'une protection totale. Il est donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer, l'enlever ou de la perturber. Elle trottine au sol et volette brièvement. Elle se nourrit d'insectes et d'autres petits invertébrés. C'est l'un des petits oiseaux les plus colorés et les plus gracieux, avec sa longue queue typique de l'espèce et ses hautes pattes. La gorge et le ventre sont d'un jaune prononcé, la tête et le dos vert olive, plus foncé vers les ailes.

La **Bergeronette flavéole** est un passereau appartenant à la famille des Motacillidae. Elle hiverne en Afrique. Elle se caractérise par une tête jaune-vert.





Le **Roitelet** est un très petit oiseau à bec fin, dont le plumage est olivâtre jaune-vert sur le dos alors que ses ailes sont plus sombres On le confond souvent avec le Troglodyte.
Le Roitelet se nourrit principalement d'insectes et d'araignées, c'est donc un animal insectivore. Deux fois par an, au sommet des conifères, les époux roitelets construisent un nid avec de la mousse, des toiles d'araignées et des fils de cocons d'insectes. Son chant est mélodieux.

L'**Effraie des clochers** ou ***Tyto alba*** est une chouette aussi couramment appelée **Chouette effraie** ou **Dame blanche**. La femelle est légèrement plus grande que le mâle. Son cri est un « khruh » ou « khraikh » rauque, strident et répétitif qu'on compare souvent au ronflement d'un dormeur. Son régime alimentaire se compose essentiellement de petits rongeurs, campagnols, mulots, souris et musaraignes. La chouette effraie chasse la nuit dans des étendues cultivées ou des prairies. Elle a besoin de cinquante fois moins d'éclairage que l'homme pour voir distinctement. Après la saison de nidification, la majorité des jeunes se disperse à moins de 20 km de leur lieu de naissance. Sa population est en régression. L'Effraie est à la base de nombreuses légendes et d'histoires de fantômes.

La **Chouette hulotte** ou ***Strix aluco*** est un rapace nocturne de la famille des Strigidae. C'est la plus connue. Le nid est généralement dans un trou d'arbre ou dans une cavité de bâtiment. Ça protège ainsi les œufs et les jeunes contre les prédateurs potentiels. Cette chouette ne migre pas et attache beaucoup d'importance à son territoire. Son ventre est pâle avec des stries sombres, et les parties supérieures du corps sont brunes ou grises ou rousses. Elle chasse les rongeurs la nuit. Les renards roux sont une cause importante de mortalité chez les jeunes fraîchement sortis du nid. La femelle est plus grande que le mâle. Elle vit 18 ans environ. La chouette hulule. Le mâle pousse un « hou-hou » sonore suivi par un « houu » plus long, une à quatre secondes plus tard. Dans les films un peu lugubres, c'est son chant qu'on entend souvent. C'est une espèce protégée.

Le **Hibou moyen duc** est une espèce de rapaces nocturnes de la famille des Strigidés. Il est légèrement plus petit et plus menu que la Chouette hulotte. Sa tête est surmontée de deux grandes aigrettes souvent dressées : on dit qu'il « fronce les sourcils ». On le reconnait bien grâce à ses yeux jaune-orangé. Son envergure est de 86 à 98 cm. À la saison des amours, on entend un « hou hou hou hou » audible au loin et aussi des bruits presque sifflants. Il met en garde par un « wupp wupp ».

Comme tous les rapaces nocturnes, les yeux sont énormes et l'ouïe très développée. Leurs deux oreilles sont décalées. Ainsi, ils entendent leurs proies avant de les voir. Une autre particularité des rapaces nocturnes est leur plumage qui leur permet un vol silencieux. Les rapaces ne font pas de nids mais utilisent des cavités.



La **Chouette chevêche** appartient à la famille des Strigidés. Elle est de petite taille, un peu plus petite qu'un pigeon. Elle est sédentaire et presque casanière. Elle affectionne les vergers où elle niche dans les cavités des vieux arbres d'où son nom de « Chouette des pommiers ». C'est la plus diurne des strigidés. On peut l'observer en plein jour perchée sur des poteaux, des murets de pierre ou sur des toits, très attentive. La chevêche se nourrit de beaucoup d'insectes coléoptères , de criquets, perce-oreilles, mais aussi de vers de terre, de petits mammifères, de jeunes passereaux, de lézards, de batraciens et de chauves-souris. Elle chasse le soir des insectes et la nuit des campagnols. Son milieu s'est appauvri : moins de cavités pour nicher (arbres abattus, ruines rénovées), moins de diversité alimentaire… Les traitements chimiques en agriculture sont responsables de la régression de la chevêche car ils font disparaître les gros insectes dont l'espèce se nourrit.

Actions de protection : la conservation des vieux arbres creux dans les vergers et des vieux bâtiments sont indispensables. On peut aussi créer artificiellement des cavités dans un vieux mur , une maison en rénovation ou même dans une maison neuve. La pose de nichoirs spécifiques en milieu favorable est aussi possible.

La **Buse variable** ou ***Buteo buteo*** est une espèce de rapaces diurnes de la famille des Accipitridés. Elle est souvent confondue avec le milan noir qui, lui, a la queue échancrée ; la buse, elle, a la queue arrondie.

L'**Epervier d'Europe** ou ***Accipiter nisus*** est une petite espèce d'oiseaux de proie de la famille des Accipitridae. Les mâles attrapent les petits oiseaux de jardin comme les mésanges, les fringillidés ou des passéridés alors que les femelles capturent surtout des grives et des étourneaux. Il «glapit» ou «tiraille» uniquement pendant la période de reproduction. Il chasse en faisant des attaques surprises et visite également nos jardins profitant des proies qui s'y trouvent.

L'Epervier d'Europe est un oiseau sacré dans les vieilles chansons bohémiennes.

Le **Faucon crécerelle** ou ***Falco tinnunculus*** est une petite espèce d'oiseaux de proie agile et diurne de la famille des Falconidés. Son petit est le fauconneau. La femelle a la tête mouchetée et une queue rousse. Le mâle a la tête et la queue gris ardoise. Il pratique le « vol battu » et le « vol plané. En action de chasse, il effectue le « vol du Saint-Esprit », un vol stationnaire caractéristique à battements d'ailes rapides .

Les derniers **Faucons pèlerins** ont disparu des falaises bretonnes dans les années 1960. Des individus originaires de Scandinavie et des îles Britanniques ont recommencé à nicher à partir de 1997. En 2012, on a compté 30 couples qui ont produit une quarantaine de poussins. En 2014, 40 couples. Ainsi donc, en une quinzaine d'années, le faucon pèlerin a opéré un retour fulgurant. On constate même qu'il commence à connaître une sorte de crise du logement. On imagine qu'ils investiront bientôt, comme ailleurs, de grands monuments urbains. Ouvrons l'œil et espérons le revoir à Baud ?

La **Perdrix grise** est un gallinacé de petite taille souvent prisée comme gibier. Elle se nourrit de graines au sol. De couleur gris bleuté, ocre à brunâtre sur les ailes et les côtés de la tête. En période nuptiale, la couleur de la tête vire à l'orangé. Le ventre est blanc, généralement marqué d'une forme de fer à cheval brun-rouille chez les mâles.

La **Caille** est un petit oiseau migrateur (15 cm de longueur environ) de la sous-famille des Perdicinae. Elle ressemble beaucoup aux perdrix, bien que plus petite. Cet oiseau est un gibier recherché. Elle se nourrit de graines au sol, d'insectes et parfois de petites proies.

La **Bécasse** des bois appartient à la famille des Scolopacidae. C'est un oiseau migrateur discret. Il est typiquement forestier et apprécie les régions bocagères comme la Bretagne. Elle arrive par un temps sombre, le plus souvent la nuit et se réfugie dans les bois où il y a beaucoup de terreau humide et de feuilles mortes. Sa chasse est réglementée : un oiseau par jour et par chasseur.

Le **Faisan** est un oiseau de la sous-famille des Phasianinae. La femelle s'appelle la **Poule faisane.** On les trouve en lisières de forêts, dans les bosquets et fourrés non loin d'un point d'eau. Ils sont omnivores et se nourrissent aussi bien de larves, d'insectes, de lézards que de pousses vertes, baies, fruits et graines. Leur nid est un creux au sol dissimulé dans les hautes herbes et garni de feuilles sèches.

Le nom de **Grive** est donné à plusieurs espèces appartenant à la famille des Turdidae et proches du Merle noir. À Baud, on peut observer la **Grive musicienne**, la **Grive draine** et la **Grive mauvis**. Cet oiseau est prisé des chasseurs. Certains la capturent encore à la chasse traditionnelle à la glu.

Proverbe : « ***faute de Grives on mange des Merles*** » : faute de ce que l'on désire, il faut se contenter de ce que l'on a.

musicienne

draine

mauvis

La **Bécassine** appartient à la famille des Scolopacidae. Apparentée à la Bécasse, elle s'en distingue par une plus petite taille et aussi quelques différences morphologiques. Cet animal donne le nom au personnage de bande dessinée créé en 1905.

La **Poule d'eau** ou ***Gallinule*** est très fréquente dans les étangs et les mares, ainsi que dans les cours d'eau où la végétation est suffisamment dense. Elle

se reconnaît facilement à son bec rouge et à son extrémité jaune. Elle a un régime alimentaire omnivore. Elle niche dans les feuillages au bord de l'eau et défend jalousement son territoire. Le mâle et la femelle restent fidèles jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre.

Le **Canard colvert** appartient à la famille des Anatidés. Le mâle est reconnaissable, pendant la période nuptiale, par sa tête d'un vert brillant. Le reste du plumage est gris-brun à blanc, avec un miroir alaire bleu-violet ; le bec est jaune. Après la période nuptiale, à l'approche de l'été, il mue et prend

son plumage éclipse (de couleur beige semblable à celui des juvéniles et des femelles). Un à deux mois plus tard environ, le mâle reprend son plumage coloré. Il peut vivre 25 à 30 ans. Il s'acclimate facilement à la vie urbaine et craint peu l'homme. Il est omnivore et se nourrit de poissons, d'herbes, de graines et de vers, de grenouilles et d'insectes.

L'**Aigrette garzette** appartient à la famille des Ardeidae. Elle est entièrement blanche avec un bec noir légèrement gris bleuté et ses pattes sont noires avec des doigts jaunes. En période nuptiale, elle porte sur la nuque deux longues plumes fines de 20 cm environ appelés les aigrettes. Elle a un régime alimentaire opportuniste. Elle se nourrit de petits poissons, d'insectes aquatiques et terrestres, de crustacés, d'amphibiens, de mollusques, d'araignées, de vers, de reptiles et de petits oiseaux. L'aigrette niche en colonie. Elle était naguère très recherchée pour son plumage par les chapeliers.

Le **Héron** est un échassier au cou long et grêle, replié en forme de « S »; son bec est jaune orangé. Il vit dans les zones humides, les plans d'eau (lacs ou étangs) et les cours d'eau, se nourrissant de batraciens, poissons ou rongeurs. Il niche dans des bois et bosquets au sein de zones humides.



Les Chauves-souris ne devraient pas apparaitre dans ce livret mais en vol, certaines soirées d'été, on peut les confondre avec un oiseau.

Les **Chiroptères** appelés couramment **Chauves-souris**, sont de la classe des Mammalia. Ce n'est pas un oiseau mais un mammifère nocturne...volant.

Généralement actifs la nuit, ils peuvent se diriger dans l'obscurité en émettant des ultrasons dont ils captent la réflexion, écholocalisant ainsi leurs proies et les obstacles.

Les Chauves-souris d'Europe sont exclusivement insectivores, ce qui explique en grande partie leur déclin. Leur régime alimentaire est identique à celui de l'hirondelle ou du martinet noir.

La **Tourterelle turque** appartient à la famille des Columbidae. Elle est plus petite que le pigeon. On dit que la Tourterelle roucoule. C'est un oiseau migrateur qui migre en début d'hiver.

La **Tourterelle des bois** est plus élancée. Le cou est marqué de griffes noires, la poitrine est délicatement rosée.

Le **Pigeon** appartient à la famille des Columbidés. Il se nourrit principalement de graines mais parfois de déchets alimentaires. Il vit entre 5 et 10 ans et forme (en général) un couple stable. Le mâle et la femelle partagent toutes les tâches y compris celle de nourrir les pigeonneaux. Le Pigeon domestique est élevé pour sa chair, mais aussi pour la colombophilie et la colombiculture.

Au XIX^{e} siècle, "plumer le pigeon" signifie filouter, duper, tromper un homme simple et naturel.

Vous êtes désormais incollables sur les oiseaux de nos jardins. Vous les reconnaissez au premier coup d'œil !

Et vos enfants ? Connaissent-ils les oiseaux de basse cour ? La comptine « Le Rock'n Roll des gallinacés » ? Sans nul doute !

Dans ma basse-cour, il y a
Des poules, des dindons, des oies.
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare.

Cot cot cot cot codec,
Cot cot cot cot codec,
Cot cot cot cot codec,
Rock and roll des gallinacés ! Yeah...

1.Poule 2.Dindon 3.Coq 4.Oie
5.Canard 6.Pintade 7.Paon
8.Canetons 9.Dinde 10.Poussins



Jardinez pour la biodiversité

Plus que nourrir les oiseaux en hiver, c'est la qualité du milieu qui favorise leurs présences dans nos jardins.

Ne désherbez pas trop

Plus vous avez de plantes variées, plus les oiseaux trouvent de nourriture. Les graines de séneçons, de pâquerettes ou de pissenlits sont consommées par les Chardonnerets. Les graines de pâturins annuels sont elles, très appréciées des Serins cini.

Plantez des essences locales

Les nombreuses essences exotiques ne conviennent pas aux insectes de notre région (laurier palme, cyprès, thuyas,…), ce sont donc des supports stériles pour les oiseaux. À l'inverse, les essences locales hébergent une petite faune nombreuse et variée, consommée par nos oiseaux. Plantez des aubépines, des prunelliers, des fusains d'Europe ou encore des troènes pour faire vos haies. En arbre d'ornement, privilégiez les bouleaux, les pommiers et les noisetiers plus favorables aux oiseaux que les Eucalyptus par exemple.

Utilisez un paillage biologique

Le paillage en plastique est une aberration écologique ! Il empêche les feuilles mortes d'enrichir le sol et c'est une barrière infranchissable pour les lombrics qui ont besoin de se nourrir des déchets végétaux. Au pieds de vos haies ou sur votre potager, utilisez des paillages biologiques (tontes de pelouse, taille de haies broyée, feuilles mortes broyées,…) pour enrichir l'humus et favoriser la multiplication des vers de terre qui vont aérer et brasser votre sol. Merles et Grives vont venir gratter pour s'y nourrir.

Laissez pousser le lierre

Le lierre n'est pas une plante parasite, il utilise l'arbre comme support pour grimper. C'est un abri essentiel pour les oiseaux qui peuvent y nicher ou dormir. Et c'est surtout un garde-manger exceptionnel ! De nombreux insectes et araignées s'y cachent et en plus, le lierre donne des fruits à la fin de l'hiver quand les autres essences n'en ont plus.

Nettoyez vos mangeoires

Les mangeoires sont-elles amies ou ennemies des oiseaux ? L'entretien des mangeoires doit être méticuleux car de nombreux agents pathogènes peuvent être présents : salmonellose (bactérie), trichomonose (parasite), variole aviaire (virus) ou mycotoxine (moisissure) qui entrainent la mort de l'oiseau. Sachez qu'il est inutile de nourrir les oiseaux en dehors des périodes de grand froid !

QUIZZ

Qui suis-je ?

Verdier d'Europe

Mésange Bleue

Rougegorge familier

Mésange charbonnière

Chardonneret élégant

Pouillot véloce

Pinson des arbres

Pie bavarde

Merle noir

1.Mésange charbonnière 2.Rougegorge familier 3.Verdier d'Europe
4.Chardonneret élégant 5.Pinson des arbres

Qui suis-je ?

Verdier d'Europe

Pie bavarde

Rougegorge familier

Mésange charbonnière

Moineau domestique

Pouillot véloce

Merle noir

Fauvette à tête noire

Mésange Bleue

Pinson des arbres

1.Pie bavarde 2.Merle noir 3.Moineau domestique

4.Fauvette à tête noire 5.Mésange bleue

Pour vous, de la part de la mairie de Baud.
Bonne découverte ornithologique...

~ Novembre 2017~

La destruction d'une espèce protégée est passible de **15 000€ d'amende** et d'**un an de prison.**

Les changements climatiques détruiront l'habitat de centaines d'espèces d'oiseaux.

L'homme a déjà fait beaucoup de dégâts avec la destruction des haies bocagères, l'utilisation intensive de pesticides, la restauration de ruines, l'urbanisation, etc… Ne serait-ce pas un juste retour que d' aider les oiseaux à nicher ? En leur créant des cavités ou en leur fabriquant des nichoirs ? En créant une plus large biodiversité dans nos jardins ?